

## Příbalová informace: informace pro uživatele

### CELSENTRI 20 mg/ml perorální roztok maravirocom

**Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.**

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci – viz bod 4.

#### **Co naleznete v této příbalové informaci**

1. Co je přípravek CELSENTRI a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek CELSENTRI užívat
3. Jak se přípravek CELSENTRI užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek CELSENTRI uchovávat
6. Obsah balení a další informace

#### **1. Co je přípravek CELSENTRI a k čemu se používá**

Přípravek CELSENTRI obsahuje léčivou látku maravirok. Maravirok patří do skupiny léčiv nazývaných *antagonisté CCR5*. Přípravek CELSENTRI blokuje receptor zvaný CCR5, který HIV (virus lidské nedostatečnosti) používá k proniknutí do krevních buněk a jejich infikování (nákaze).

#### **Přípravek CELSENTRI se užívá k léčbě infekce virem lidské imunodeficiency typu-1 (HIV-1) u dospělých, dospívajících a dětí od 2 let věku a s tělesnou hmotností alespoň 10 kg.**

Přípravek CELSENTRI musí být užíván v kombinaci s jinými přípravky užívanými k léčbě infekce HIV. Tyto léčivé přípravky se nazývají léky proti HIV nebo antiretrovirotika.

Přípravek CELSENTRI, jako součást kombinované léčby, snižuje množství viru ve Vašem těle a udržuje ho na nízké úrovni. To pomáhá tělu zvýšit počet CD4 buněk v krvi. CD4 buňky jsou typem bílých krvinek, který je důležitý pro pomoc Vašemu tělu v boji s infekcí.

#### **2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek CELSENTRI užívat**

##### **Neužívejte přípravek CELSENTRI,**

- jestliže jste **alergický(á)** (nebo je Vaše dítě alergické, je-li pacientem) na maravirok nebo na kteroukoli další složku přípravku CELSENTRI (uvedenou v bodu 6).

➔ **Poradte se s lékařem**, pokud se domníváte, že se to Vás nebo Vašeho dítěte týká.

##### **Upozornění a opatření**

Váš lékař Vám musí odebrat vzorky krve k testu, zda je přípravek CELSENTRI pro Vás (nebo Vaše dítě, je-li pacientem) vhodnou léčbou.

U některých osob užívajících CELSENTRI se vyvinuly závažné alergické reakce nebo kožní reakce (viz také „Závažné nežádoucí účinky“ v bodu 4).

Před zahájením léčby přípravkem se ujistěte, že je Váš lékař informován o tom, že máte (nebo Vaše dítě má) nebo jste v minulosti měl(a) cokoli z dále uvedeného:

- **jaterní problémy** včetně chronické **hepatitidy (zánětu jater) B** nebo **C**. Přípravek CELSENTRI užívalo pouze omezené množství osob s jaterními problémy. Vaše jaterní funkce budou asi muset být pečlivě sledovány (viz také „Jaterní problémy“ v bodu 4).
  - **nízký krevní tlak**, včetně závratí po rychlém postavení nebo posazení se nebo užíváte-li léky na snížení krevního tlaku. To je způsobeno náhlým poklesem krevního tlaku. Dojde-li k tomu, položte se, dokud se nebudete (Vaše dítě se nebude) cítit lépe.
  - **tuberkulóza (TBC)** nebo závažné **plísňové (mykotické) infekce**. Přípravek CELSENTRI by potenciálně mohl zvýšit riziko rozvoje infekcí.
  - **problémy s ledvinami**. To je **důležité zejména**, pokud také užíváte některé jiné léčivé přípravky (viz „Další léčivé přípravky a přípravek CELSENTRI“ dále v bodu 2).
  - **problémy se srdcem nebo oběhovým systémem**. Přípravek CELSENTRI užívalo pouze omezené množství osob se závažnými srdečními nebo oběhovými potížemi.
- ➔ **Oznamte svému lékaři** před zahájením léčby, pokud se domníváte, že se Vás (Vašeho dítěte) cokoli z toho týká.

### Stavy, na které je nutno dávat pozor

U některých osob užívajících přípravky k léčbě infekce HIV se vyvinou jiné stavy, které mohou být závažné. Ty zahrnují:

- příznaky infekce a zánětu;
- bolest kloubů, ztuhlost a problémy s kostmi.

Musíte vědět o důležitých známkách a příznacích, na které si musíte během užívání přípravku CELSENTRI dát pozor.

- ➔ **Přečtěte si informaci „Další možné nežádoucí účinky kombinované léčby infekce virem HIV“ v bodu 4 této příbalové informace.**

### Chraňte ostatní osoby

Infekce HIV se šíří pohlavním stykem s nakaženou osobou nebo přenosem nakažené krve (například sdílením injekčních jehel). I když užíváte tento léčivý přípravek, stále můžete (Vaše dítě může) šířit HIV, ačkoli riziko je účinnou léčbou sníženo.

- ➔ Poradte se s lékařem o opatřeních potřebných k zabránění přenosu infekce na další osoby.

### Starší osoby

Přípravek CELSENTRI užívalo pouze omezené množství osob ve věku 65 let nebo starších. Patříte-li do této věkové skupiny, poradte se o užívání přípravku CELSENTRI se svým lékařem.

### Děti

Užívání přípravku CELSENTRI nebylo studováno u dětí mladších než 2 roky nebo s tělesnou hmotností nižší než 10 kg. Proto se přípravek CELSENTRI nedoporučuje dětem mladším než 2 roky nebo s tělesnou hmotností nižší než 10 kg.

### Další léčivé přípravky a přípravek CELSENTRI

**Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte (užívá Vaše dítě), které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.**

Oznamte svému lékaři nebo lékárníkovi, pokud během užívání přípravku CELSENTRI začnete (Vaše dítě začne) užívat nový léčivý přípravek.

Přípravky obsahující **třezalku tečkovanou** (*Hypericum perforatum*) pravděpodobně zabrání přípravku CELSENTRI účinkovat správně. **Během užívání přípravku CELSENTRI je nemáte užívat.**

Některé léčivé přípravky mohou změnit množství přípravku CELSENTRI v těle, jsou-li užity v tutéž dobu jako CELSENTRI. Ty zahrnují:

- jiné léčivé přípravky k léčbě infekce **HIV** nebo **hepatitidou C** (jako atazanavir, kobicistat, darunavir, efavirenz, etravirin, fosamprenavir, indinavir, lopinavir, nelfinavir, ritonavir, sachinavir, boceprevir, telaprevir);
  - **antibiotika** (klarithromycin, telithromycin, rifampicin, rifabutin);
  - **antimykotika** (ketokonazol, itrakonazol, flukonazol);
  - **antiepileptika** (karbamazepin, fenytoin, fenobarbital).
- ➔ Oznamte svému lékaři, že užíváte (Vaše dítě užívá) některý z těchto léčivých přípravků. To lékaři umožní, aby předepsal správnou dávku přípravku CELSENTRI.

### **Těhotenství**

Pokud jste těhotná, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět:

- ➔ **porad'te se s lékařem** o rizicích a prospěchu užívání přípravku Celsentri.

### **Kojení**

**Ženy infikované virem HIV nesmějí kojít**, protože infekce HIV může být přenesena mateřským mlékem na dítě.

Není známo, zda složky přípravku CELSENTRI mohou přecházet do mateřského mléka. Pokud již kojíte nebo uvažujete o tom, že začnete kojít:

- ➔ **porad'te se neprodleně se svým lékařem.**

### **Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů**

Přípravek CELSENTRI může vyvolat závrať.

- ➔ **Neříd'te dopravní prostředek, nejezd'te na kole nebo neobsluhujte žádné přístroje nebo stroje**, pokud si nejste jistý(á), že nejste ovlivněn(a).

## **3. Jak se přípravek CELSENTRI užívá**

Vždy užívejte nebo podávejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), porad'te se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Lékař Vám poradí, zda není lepší užívat CELSENTRI perorální roztok, pokud nejste schopen(schopna/Vaše dítě není schopno) polykat tablety.

### **Jaká dávka přípravku se užívá**

#### **Dospělí**

Doporučená dávka přípravku CELSENTRI je buď **150 mg (7,5 ml)**, **300 mg (15 ml)** nebo **600 mg (30 ml) dvakrát denně** v závislosti na ostatních léčivých přípravcích, které užíváte ve stejnou dobu. Vždy užívejte dávku doporučenou Vaším lékařem.

#### **Osoby s problémy s ledvinami**

Máte-li problém s ledvinami, lékař může Vaši dávku upravit.

- ➔ **Porad'te se s lékařem**, pokud se Vás to týká.

#### **Dospívající a děti od 2 let věku a s tělesnou hmotností alespoň 10 kg**

O správné dávce přípravku CELSENTRI rozhodne Váš lékař podle tělesné hmotnosti a jiných léčivých přípravků užívaných současně.

**Návod, jak odměřit a užít (nebo podat) dávku léčivého přípravku, je uveden v diagramu a pokynech na konci tohoto bodu.**

**Přípravek CELSENTRI se může užívat s jídlem nebo bez jídla.** Přípravek CELSENTRI se vždy užívá ústy.

Přípravek CELSENTRI se musí užívat v kombinaci s jinými léčivými přípravky k léčbě HIV. Pročtěte si v příbalové informaci těchto léčivých přípravků, jak tyto léky užívat.

### **Jestliže jste užil(a) nebo podal(a) více přípravku CELSENTRI, než jste měl(a)**

Pokud jste náhodně užil(a) nebo podal(a) více přípravku CELSENTRI:

➔ **obrat' se ihned na svého lékaře nebo na nejbližší nemocnici.**

### **Jestliže jste zapomněl(a) užít nebo podat přípravek CELSENTRI**

Jestliže jste vynechal(a) (Vaše dítě vynechalo) dávku přípravku CELSENTRI, vezměte si (podejte) vynechanou dávku co možná nejdříve a pokračujte s další dávkou v pravidelnou dobu.

Pokud je již téměř čas pro následující dávku, vynechanou dávku si neberte (nepodávejte). Počkejte na následující dávku v pravidelnou dobu.

**Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.**


### **Jestliže jste přestal(a)/Vaše dítě přestalo) užívat přípravek CELSENTRI**

Užívejte přípravek CELSENTRI, dokud Vám lékař neřekne, že máte přestat.

Užívání léčivého přípravku ve správnou dobu každý den je důležité, protože to zaručuje, že se infekce HIV ve Vašem těle nerozšiřuje. Proto je důležité, abyste přípravek CELSENTRI užíval(a)/Vaše dítě užívalo) správně tak, jak je uvedeno výše, dokud Vám lékař nedoporučí léčbu ukončit.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

### **Jak odměřit dávku a užít léčivý přípravek**



K přesnému odměření své dávky použijte aplikátor, který je součástí dodávaného balení.

1. **Sejměte z lahvičky uzávěr (A).** Víčko odložte tak, abyste jej neztratil(a).
2. Držte lahvičku pevně. **Do jejího hrdla zasuněte umělohmotný adaptér (B)**, jak nejvíce to jde.
3. Do adaptéru **upevněte aplikátor (C)**.
4. Obraťte lahvičku dnem vzhůru.
5. **Vytažením pístu aplikátoru (D)** natáhněte do aplikátoru první část předepsané dávky.
6. Obraťte lahvičku zpět do polohy hrdlem vzhůru. **Vyjměte aplikátor** z adaptéru.
7. **Vložte aplikátor do úst (Vašich nebo Vašeho dítěte)** a nasměrujte hrot aplikátoru proti vnitřní straně tváře. **Vyprázdněte aplikátor stlačením pístu**, které má být pomalé, abyste měl(a) dost času na spolknutí roztoku. Rychlé vystříknutí roztoku dozadu do hrdla by mohlo vyvolat dávení nebo dušení.
8. **Opakujte výše uvedené kroky v bodech 3 až 7**, dokud neužijete celou dávku přípravku. Např., pokud Vaše dávka roztoku je 15 ml, je třeba jeden a půl aplikátoru.
9. **Sejměte aplikátor** a důkladně ho **umyjte** v čisté vodě, poté co jste ho přestal(a) používat. Před opětovným použitím ho nechte vyschnout.
10. **Pevně uzavřete lahvičku** uzávěrem, aniž byste vyndal(a) adaptér.

Znehodnoťte veškerý nepoužitý perorální roztok po 60 dnech od prvního otevření lahvičky.

#### 4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Sdělte svému lékaři, pokud si všimnete jakýchkoliv zvláštností v souvislosti s Vaším zdravotním stavem nebo zdravotním stavem Vašeho dítěte.

**Závažné nežádoucí účinky – okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc**

**Závažné alergické nebo kožní reakce**

U některých osob užívajících CELSENTRI se vyvinuly závažné a život ohrožující kožní reakce a alergické reakce. Ty jsou vzácné a mohou se objevit až u 1 z 1 000 osob užívajících přípravek CELSENTRI.

Objeví-li se u Vás během užívání přípravku CELSENTRI jakýkoli z následujících příznaků:

- otok obličeje, rtů nebo jazyka;
  - obtíže s dýcháním;
  - rozsáhlá kožní vyrážka;
  - horečka (zvýšená tělesná teplota);
  - puchýřky a olupující se kůže, zejména kolem úst, nosu, očí a genitálií (zevních pohlavních orgánů),
- ➔ **vyhledejte neprodleně lékaře. Přestaňte okamžitě přípravek CELSENTRI užívat.**

### **Problémy s játry**

Tyto stavy jsou vzácné a mohou se objevit až u 1 z 1 000 osob užívajících přípravek CELSENTRI. Příznaky zahrnují:

- ztrátu chuti k jídlu;
- pocit na zvracení nebo zvracení;
- žluté zbarvení kůže nebo očí;
- kožní vyrážku nebo svědění;
- pocit velké únavy;
- bolest nebo citlivost břicha;
- tmavé zbarvení moči;
- ospalost a zmatenost;
- horečku (zvýšenou teplotu).

➔ Pokud se u Vás vyskytnou tyto příznaky, **vyhledejte neprodleně lékaře. Přestaňte užívat přípravek CELSENTRI.**

### **Další nežádoucí účinky**

#### **Časté nežádoucí účinky**

Ty se mohou objevit až u 1 až 10 ze 100 osob:

- průjem, pocit nevolnosti, bolest žaludku, plynatost;
- ztráta chuti k jídlu;
- bolest hlavy, problémy se spánkem, deprese;
- vyrážka (viz také „Závažné alergické nebo kožní reakce“ výše v bodu 4);
- pocit slabosti nebo ztráta energie, chudokrevnost (pozorovaná ve výsledcích krevních testů);
- zvýšení hladin jaterních enzymů (pozorované ve výsledcích krevních testů), což může být známkou problémů s játry (viz také „Problémy s játry“ výše v bodu 4).

#### **Méně časté nežádoucí účinky**

Ty se mohou objevit až u 1 ze 100 osob:

- plicní infekce;
- mykotické infekce jícnu;
- záchvaty (křeče);
- pocit závratí, pocit na omdlení nebo točení hlavy po postavení se;
- selhání ledvin, přítomnost bílkoviny v moči;
- zvýšení hladiny látky zvané CPK (pozorované ve výsledcích krevních testů), což je známkou zanícení nebo poškození svalů.

#### **Vzácné nežádoucí účinky**

Ty se mohou objevit až u 1 z 1 000 osob:

- bolest na hrudi (způsobená sníženým průtokem krve do srdce);
- úbytek svalové hmoty;
- některé typy zhoubného nádorového onemocnění, jako je onemocnění jícnu a žlučovodu;
- snížení počtu krevních buněk (pozorované ve výsledcích krevních testů).

### **Další možné nežádoucí účinky kombinované léčby infekce virem HIV**

U osob užívajících kombinovanou léčbu infekce HIV se mohou objevit i další nežádoucí účinky.

#### **Příznaky infekce a zánětu**

Osoby s pokročilou infekcí HIV (AIDS) mají slabý imunitní systém a jsou náchylnější k vývoji závažných infekcí (*oportunní infekce*). Po zahájení léčby imunitní systém posílí a může s infekcemi bojovat.

**Příznaky infekce a zánětu** se mohou vyvinout, protože:

- staré skryté infekce znovu vzplanou, jak proti nim tělo bojuje
- nebo imunitní systém napadne zdravou tělní tkáň (*autoimunitní poruchy*).

**Tyto příznaky autoimunitních poruch** se mohou vyvinout mnoho měsíců po zahájení užívání léčivého přípravku k léčbě infekce HIV. Příznaky obvykle zahrnují:

- svalovou slabost;
- slabost začínající v rukách a nohách a postupující směrem k trupu.
- palpitace (bušení srdce) nebo třes;
- hyperaktivitu (nadměrný neklid a pohyblivost).

Objeví-li se u Vás jakýkoli příznak infekce nebo zaznamenáte-li jakýkoli z příznaků uvedených výše:

➔ **oznamte to okamžitě svému lékaři.** Neužívejte žádné léčivé přípravky proti infekci bez porady s lékařem.

#### **Bolest kloubů, ztuhlost a problémy s kostmi**

U některých osob, které užívají kombinovanou léčbu infekce virem HIV, se může objevit onemocnění nazývané *osteonekróza*. Při tomto onemocnění části kostní tkáně odumírají z důvodu nedostatečného cévního zásobení kostí.

Není známo, jak často se tyto stavy vyskytují. S větší pravděpodobností se u Vás objeví, pokud:

- užíváte kombinovanou léčbu delší dobu;
- rovněž užíváte protizánětlivé léky nazývané kortikosteroidy;
- konzumujete alkohol;
- je Váš imunitní systém velmi slabý;
- trpíte nadváhou.

**Příznaky, kterým je třeba věnovat pozornost, zahrnují:**

- ztuhlost kloubů;
- bolesti (zvláště kyčlí, kolen a ramen);
- obtíže s pohybem.

Pokud zaznamenáte kterýkoli z těchto příznaků:

➔ **oznamte to svému lékaři.**

#### **Hlášení nežádoucích účinků**

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím **národního systému hlášení nežádoucích účinků** uvedeného v [Dodatku V](#). Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

## 5. Jak přípravek CELSENTRI uchovávat

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Přípravek CELSENTRI nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce nebo lahvičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte perorální roztok při teplotě do 30 °C.

Znehodnoťte 60 dní po prvním otevření. Na vyznačené místo na krabičce napište datum, kdy má být perorální roztok zlikvidován. Datum zapište, jakmile lahvičku poprvé otevřete.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

## 6. Obsah balení a další informace

### Co přípravek CELSENTRI obsahuje

- Léčivou látkou perorálního roztoku CELSENTRI je maravirocum. Jeden ml perorálního roztoku obsahuje maravirocum 20 mg.

Pomocnými látkami jsou: kyselina citronová, dihydrát natrium-citrátu, sukralosa, natrium-benzoát, tekuté jahodové aroma, čištěná voda

### Jak přípravek CELSENTRI vypadá a co obsahuje toto balení

CELSENTRI perorální roztok se dodává v krabičce obsahující lahvičku z polyethylenu o vysoké hustotě s dětským bezpečnostním uzávěrem. Roztok je bezbarvý s jahodovou příchutí. Lahvička obsahuje 230 ml roztoku maraviroku (20 mg/ml). Balení obsahuje také aplikátor a adaptér na lahvičku, který se před použitím zasune do hrdla lahvičky.

Držitel rozhodnutí o registraci

ViiV Healthcare UK Ltd, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, Velká Británie.

Výrobce

Pfizer Service Company, Hoge Wei 10, B 1930 Zaventem, Belgie.

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

#### **België/Belgique/Belgien**

ViiV Healthcare sprl/bvba  
Tél/Tel: + 32 (0) 10 85 65 00

#### **Lietuva**

GlaxoSmithKline Lietuva UAB  
Tel: + 370 5 264 90 00  
info.lt@gsk.com

#### **България**

ГлаксоСмитКлайн ЕООД  
Тел.: + 359 2 953 10 34

#### **Luxembourg/Luxemburg**

ViiV Healthcare sprl/bvba  
Belgique/Belgien  
Tél/Tel: + 32 (0) 10 85 65 00



**Česká republika**  
GlaxoSmithKline s.r.o.  
Tel: + 420 222 001 111  
[cz.info@gsk.com](mailto:cz.info@gsk.com)

**Danmark**  
GlaxoSmithKline Pharma A/S  
Tlf: + 45 36 35 91 00  
dk-info@gsk.com

**Deutschland**  
ViiV Healthcare GmbH  
Tel.: + 49 (0)89 203 0038-10  
vii.med.info@viihealthcare.com

**Eesti**  
GlaxoSmithKline Eesti OÜ  
Tel: + 372 6676 900  
estonia@gsk.com

**Ελλάδα**  
GlaxoSmithKline A.E.B.E.  
Τηλ: + 30 210 68 82 100

**España**  
Laboratorios ViiV Healthcare, S.L.  
Tel: + 34 902 051 260  
es-ci@viihealthcare.com

**France**  
ViiV Healthcare SAS  
Tél.: + 33 (0)1 39 17 6969  
Infomed@viihealthcare.com

**Hrvatska**  
GlaxoSmithKline d.o.o.  
Tel: + 385 1 6051 999

**Ireland**  
GlaxoSmithKline (Ireland) Limited  
Tel: + 353 (0)1 4955000

**Ísland**  
Vistor hf.  
Sími: + 354 535 7000

**Italia**  
ViiV Healthcare S.r.l.  
Tel: + 39 (0)45 9212611

**Magyarország**  
GlaxoSmithKline Kft.  
Tel.: + 36 1 225 5300

**Malta**  
GlaxoSmithKline Malta  
Tel: + 356 21 238131

**Nederland**  
ViiV Healthcare BV  
Tel: + 31 (0)30 6986060  
contact-nl@viihealthcare.com

**Norge**  
GlaxoSmithKline AS  
Tlf: + 47 22 70 20 00

**Österreich**  
GlaxoSmithKline Pharma GmbH  
Tel: + 43 (0)1 97075 0  
at.info@gsk.com

**Polska**  
GSK Services Sp. z o.o.  
Tel.: + 48 (0)22 576 9000

**Portugal**  
ViiVHVH HEALTHCARE, UNIPESSOAL, LDA.  
Tel: + 351 21 094 08 01  
vii.v.fi.pt@viihealthcare.com

**România**  
GlaxoSmithKline (GSK) S.R.L.  
Tel: + 4021 3028 208

**Slovenija**  
GlaxoSmithKline d.o.o.  
Tel: + 386 (0)1 280 25 00  
medical.x.si@gsk.com

**Slovenská republika**  
GlaxoSmithKline Slovakia s. r. o.  
Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11  
recepacia.sk@gsk.com

**Suomi/Finland**  
GlaxoSmithKline Oy  
Puh/Tel: + 358 (0)10 30 30 30  
Finland.tuoteinfo@gsk.com

**Κύπρος**

GlaxoSmithKline (Cyprus) Ltd

Τηλ: + 357 22 39 70 00

[gskcyprus@gsk.com](mailto:gskcyprus@gsk.com)**Sverige**

GlaxoSmithKline AB

Tel: + 46 (0)8 638 93 00

info.produkt@gsk.com

**Latvija**

GlaxoSmithKline Latvia SIA

Tel: + 371 67312687

lv-epasts@gsk.com

**United Kingdom**

ViiV Healthcare UK Ltd

Tel: + 44 (0)800 221441

customercontactuk@gsk.com

**Tato příbalová informace byla naposledy revidována 04/2018.**

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky na adrese <http://www.ema.europa.eu/>.